

芝浦工業大学 新型コロナワクチン 職域接種

2 回目接種にむけた Q&A

○用紙関係

Q 1

＜全対象＞ 接種券が自治体から届きました。これを持って行けばいいですか。

はい。シートのまま（シールをはがさずに）、2 回目接種の時に持ってきてください。

Q 2

＜全対象＞ 自治体から送られてきた封筒の中に、予診票も入っていましたが、これを使いますか。

いいえ。予診票は大学専用のものを使います。ダウンロードして記入の上持参してください。その際、接種を受けるキャンパスごとに用紙が違いますので、注意してください。

Q 3

＜学生＞ 1 回目の接種の後、接種券は回収されてしまい、手元にありません。

学生の接種券は大学で預かっています。ご安心ください。
当日の持ち物は、2 回目の予診票と学生証、筆記用具だけです。

Q 4

＜全対象＞ 接種券を紛失して／捨ててしまいました。接種できますか。

ただちに自治体に再発行申請をしてください。そのうえで接種を受け付けます。受付でその旨申し出てください。

Q 5

＜全対象＞ 接種券がまだ届いていませんが、接種を受けられますか。

受けられます。接種後に郵送用の封筒をお渡ししますので、自治体から届き次第、接種券をその封筒に入れて接種したキャンパスの学生課に提出するか、郵送してください。

○日程・会場関係

Q 6

＜全対象＞ 日程的にどうしても 2 回目接種が受けられません。前の週か後ろの週に、本学あるいは別のどこかで接種できませんか。

本学での接種日程は決まっており、前倒しや延長はできません。また、他の職域会場の紹介はできません（そうした情報がありません）。接種辞退となります。その場合、案内書の 1. 日程の項をよく読んで、必ず事前に手続きを行ってください。

Q 7

＜全対象＞ 一時的な体調不良で期間中に受けられない場合、どうなりますか。

残念ながら接種辞退となります。事前にわかっている場合は、案内書の 1. 日程の項をよく読んで、必ず手続きを行ってください。最終日の場合は、接種キャンパスの学生課まで電話してください。

Q 8

＜全対象＞ 会場（キャンパス）の変更はできますか。

できません。ワクチン供給量は両キャンパスとも余裕はありません。1 回目接種した会場で 2 回目も接種を受けてください。

Q 9

＜学生・教職員＞ 1 回目と同じ会場で接種する予定ですが、曜日と時間を変えてもいいですか。

あなたの接種すべき曜日と時間は、第 1 回目接種をもとに既に割り振られています。ただし変更が可能です。詳しくは案内の 3. 曜日・時間をよく読んでください。

○体調・副反応関係

Q 10

＜全対象＞ 1 回目接種後に強い副反応が出ました。2 回目も接種して大丈夫ですか。

意識を失う等の強い副反応が出た場合は、かかりつけ医に相談してください。そのうえで 2 回目接種を行う場合、1 回目の状況を問診時に医師に必ず伝えてください。不安な場合は保護者・保証人やご家族に同行してもらってください。

Q 11

＜全対象＞接種後の高熱などの副反応が不安です。解熱剤などの処方がありますか

職域接種会場、および大学保健室には解熱剤はありません。
ワクチンによる発熱は接種後 1～2 日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子をみていただくことになります。発熱時に市販の解熱剤を使用することもできますが、解熱剤による副作用もありますので、使用する際は必ず「かかりつけ医」や薬局・ドラッグストアの薬剤師にご相談ください。

Q12

＜全対象＞接種後に高熱が出たり、体調不良になった場合の連絡先を教えてください。

ご自身の「かかりつけ医」またはお住いの自治体の新型コロナワクチン副反応窓口へご相談ください。

なお、以下の医療機関でもご相談いただけます。

「イムス板橋検診センター」 TEL：03-3967-1515

※平日 8：30～17：30 土曜 8：30～12：30 ※日祝日はお休み

Q13

＜全対象＞アレルギーや持病があり薬を飲んでいますが、1 回目接種時は特に副反応はありませんでした。2 回目も接種して大丈夫ですか。

問診時に自身の状態を必ず伝えてください。不安な場合は、保護者・保証人、ご家族等に同行してもらってください。

Q14

＜全対象＞先週ワクチン接種を受けたのですが、接種した腕に痛みや腫れを伴う発疹が出てきました。医療機関を受診した方が良いですか。

ワクチン接種後、数日から 1 週間後くらいに、注射をした側の腕にかゆみや痛み、腫れや赤みを伴う発疹が報告されています。不快ではありますが、それ以外は健康に害はなく、1 週間ほどで自然によくなるため、心配はいりません。

接種部位の痛みや腫れ」がつらい場合は、接種部位を冷やしたり、適度に手を動かしたりしてかまいません。熱があるときは、水分を十分にとって、薄着をしてください。

症状がひどい場合や、数日しても改善しない場合は皮膚科医に相談してください。

Q15

＜全対象＞昨日ワクチン接種を受けましたが、今日は朝から体が重く倦怠感が強いのですが、良い薬はありますか。軽い頭痛もあります。

ワクチン接種後には、免疫反応が起こるために、発熱・倦怠感・頭痛等の症状が出る場合があります。こうした症状は、数日間で改善していくことが多いですが、症状がひどい場合、治らない場合には、市販されている鎮痛解熱剤を使用することもできますが、使用制限等あるので必ず「かりつけ医」や薬剤師にご相談の上、使用してください。

なお、倦怠感があるうちは、無理な活動をせず、体を休めるようにしてください。

Q16

＜全対象＞様々な副反応があるようですが、副反応を防ぐ方法がありますか。

ワクチン接種は免疫抗体を獲得するために行うため、1回目よりも2回目に強い免疫反応が現れますが、この結果抗体を獲得できるのでから正常な反応といえます。接種部位の腫れ、痛みのほか発熱、頭痛、倦怠感など何かしらの症状が起きる人が多いようです。

接種前後は、十分な睡眠をとり、接種後は水分を多めに取り、激しい運動をや飲酒を避けて、体を休めるように心がけてください。